

Emortrofine® H

Gel per sollievo proctologico

Con Tri-Solve P
Tecnologia filmante brevettata

Gel a base di **Acido Ialuronico**, componente presente in elevate quantità nella matrice extracellulare, in grado di generare un microambiente ottimale che contribuisce alla riparazione tissutale.
Formula leggera, fresca e delicata, a base di ingredienti naturali ad azione protettiva, emolliente e lenitiva. Offre immediato sollievo, grazie alla sua **eccellente azione lubrificante**.
Il trattamento è arricchito di un **ingrediente brevettato** - **Tri-Solve P** - in grado di formare un film invisibile con effetto barriera, ripristinando il corretto livello di idratazione e la fisiologica elasticità della mucosa anale.
Emortrofine® H crea un film lubrificante che protegge le emorroidi da ulteriore irritazione. Agisce come scudo favorendo i fisiologici processi di riparazione tissutale idratando e proteggendo la cute e le mucose.
Riduce e allevia i fastidiosi sintomi della patologia emorroidaria quali dolore, prurito e bruciore.

INDICAZIONI

Indicato nei processi di disturbi anorettali quali: **emorroidi** interne ed esterne, **ragadi anali**, **proctiti** e **prurito anale**.
Ideale nel trattamento prolungato di sintomi cronici e in caso di:
- Prolasso dei tessuti
- Costipazione
- Tendenza alla ricaduta

Mantiene il tono e l'elasticità fisiologiche. Utile come trattamento preventivo per limitare le recidive.

Indicato per l'uso da parte di adulti.

Formula priva di cortisone.

FORMULA CLINICAMENTE TESTATA

Emortrofine® H è dermatologicamente testato.

Emortrofine® H

DOSE E MODO D'USO
Per applicazione perianale e/o endorettale.
Lavare con attenzione le aree affette prima dell'applicazione.
Applicare due o tre volte al giorno dopo ogni evacuazione.
Continuare il trattamento per 1-2 settimane fino alla scomparsa dei sintomi.
Dopo l'applicazione è consigliabile evitare l'evacuazione per almeno 20-30 minuti, così da non rimuovere il prodotto prima del dovuto.

MODO D'USO
Svitare il tappo, bucare il sigillo di sicurezza con la parte posteriore del tappo e svitare il collo della cannula endorettale dal tubo stesso. Rimuovere il tappo della cannula e spremere il tubo finché la cannula si riempie di gel. Fare attenzione a rilasciare una piccola quantità di prodotto per lubrificare la cannula, facilitando l'applicazione. Inserire la cannula nel retto. Spremere il tubo finché una quantità sufficiente di prodotto viene inserita. Applicare anche sull'area esterna. Dopo l'uso, lavare con attenzione la cannula, asciugarla e coprirla con il tappo. Assicurarsi che il tubo sia chiuso correttamente.

COMPOSIZIONE
Acido Ialuronico (0,2%), Trisolve P (0,2%) (Trealosio, Ceramide NS, Lecitina Idrogenata), Metilsulfonilmetano, Glicerina, Idrossietilcellulosa, Bisabololo, Acqua, Sorbitolo, Glicole Pentilenico, Glicole Propilenico, EDTA Bisodico, Copolimero Calcio/Sodio, Triclosan, Symdiol (1,2-Hexanediol, Tropolone, Caprylyl Glycol), Idrossido di sodio.

ASPETTO
Gel disponibile in tubo da 30 ml con cannula multiuso per applicazione interna.
La cannula forata anche lateralmente consente una migliore applicazione.

Non unge, non macchia.

AVVERTENZE
Il dispositivo non è soggetto a speciali precauzioni d'uso, raccomandiamo tuttavia di:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Non eccedere la dose d'uso raccomandata;
- Non utilizzare dopo la data di scadenza; la data di scadenza si riferisce al prodotto intatto e propriamente conservato; utilizzare entro 12 mesi dalla prima apertura;
- In caso di reazioni avverse, sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico per stabilire la terapia più appropriata;
- Non sono emersi dati da segnalare in merito ad interazione con farmaci normalmente utilizzati nella terapia di emorroidi o ragadi anali.
- Utilizzare il prodotto per cicli di 4 settimane.

In caso di utilizzo in gravidanza o allattamento, consultare il proprio medico.
Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.

Emortrofine® H

L'osservanza delle istruzioni contenute nel foglietto illustrativo riduce il rischio di effetti collaterali. È importante informare il proprio medico o farmacista riguardo ad alcun effetto collaterale non menzionato nel foglietto illustrativo.

Conservare questo foglietto per avere sempre tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo del dispositivo medico.
Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in caso di reazioni allergiche agli ingredienti.

FABBRICANTE

Alma S.r.l. Via A. Bertani, 6 - 20154 Milano - Italy
Dispositivo medico di classe IIb

Alma S.r.l.
Via A. Bertani, 6
20154 Milano, Italia



CE 1370
Rev 02
Ottobre 2024

MD



Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.